

大腸CT検査を受けられる方へ 夜検査用

検査日： 月 日 曜日	様	来院時間： 時 分
		検査時間： 時 分

正確な診断が受けられるように、次のことを確実に行ってください。
 ☆マグコロールP服用後は、歩行・体操などで体を動かしてください。腸の動きが活発になって効果的です。
 ☆マグコロールP服用中に、吐き気・嘔吐・腹痛などの症状が現れた場合にはご連絡ください。

		チェック欄
検査の前日	昼食	普段通りの昼食をお召し上がりください。ただし、海藻、キノコ類は避けてください。
	夕食(検査食)	 <p>コンソメスープ カレーライス</p>
	就寝前	 <p>ラキソベロン10mlと コップ1杯(200ml)以上の水を飲んでください。</p> <p>就寝前 水 (200ml) 以上</p>
検査の当日	朝食(検査食)	<p>朝食は午前7時までに召し上がってください。</p>  <p>お吸い物 親子丼</p> <p>食後 水 (200ml) 以上</p>
	昼食	<p>昼食は午前10時までに召し上がってください。</p>  <p>コーンスープ 中華粥</p> <p>食後 水 (200ml) 以上</p>
	午前10~12時	 <p>マグコロールP + 大きめのボトル マグコロールPを水1800mlにそれぞれ溶かして飲んでください</p>
マグコロールP内服後は絶飲食です。		

注意) 卵アレルギー・カレーの食べられない方は、素うどんに変更して下さい。

- ※カレーライス、親子丼、バナナ・オ・レ、ミルクココアは食べる順番が入れ替わってもかまいません。
- ※水のような便が数回出るのが普通です。できるだけ排便してください。
- ※次の症状がでた場合は、直ちに服用を止め、医師・看護師にご相談ください。
 (吐気、吐く、お腹が痛い、顔が青ざめる、めまい、寒気、じんましん、息苦しい、顔のむくみ)