

大腸CT検査を受けられる方へ 夜検査用

検査日： 月 日 曜日 様 来院時間： 時 分
 検査時間： 時 分

正確な診断が受けられるように、次のことを確実に行ってください。
 ☆マグコロールP服用後は、歩行・体操などで体を動かしてください。腸の動きが活発になって効果的です。
 ☆マグコロールP服用中に、吐き気・嘔吐・腹痛などの症状が現れた場合にはご連絡ください。

			チェック欄
前々日	下剤	21時にプルゼニド錠を2錠服用してください。 	
検査の前日	朝食	普段通りの朝食をお召し上がりください。ただし、海藻、キノコ類は避けてください。	
	昼食	普段通りの昼食をお召し上がりください。ただし、海藻、キノコ類は避けてください。	
	夕食(検査食)	 カレーライス コンソメスープ 食後  コロンフォート(1本)	
	下剤	21時にプルゼニド錠を2錠服用してください。 	
検査の当日	朝食(検査食)	朝食は午前7時までに召し上がってください。  親子丼 お吸い物 食後   コロンフォート(1本) 水(200mL)以上	
	昼食(検査食)	昼食は午前10時までに召し上がってください。  中華 コーンスープ 食後   コロンフォート(1本) 水(200mL)以上	
	午前10～11時	 +  マグコロールP 大きめのボトル マグコロールPを水400mLに溶かして飲んでください。	
	マグコロールP内服後は絶飲食です。		

注意) 卵アレルギー・カレーの食べられない方は、素うどんに変更してください。

- ※コロンフォートはよく振ってからお飲みください。
- ※カレーライス、親子丼は食べる順番が入れ替わってもかまいません。
- ※水のような便が数回出るのが普通です。できるだけ排便してください。
- ※次の症状がでた場合は、直ちに服用を止め、医師・看護師にご相談ください。
 (吐気、吐く、お腹が痛い、顔が青ざめる、めまい、寒気、じんましん、息苦しい、顔のむくみ)